

04026

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL  
DE LAS INDUSTRIAS Y DEL TRABAJO  
en TURÍN, Abril-Octubre de 1911

EN OCASIÓN DEL

50° Aniversario de la proclamación del Reino de Italia  
bajo el alto Patronato de S. M. el Rey

Programas

y

Clasificaciones

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
E INGENIERÍA  
Clasificación

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
CONTADURÍA  
INVENTARIO DE

Estante: 102

FICHA N.º

Nº 425-

CATÁLOGO  
DE LAS  
PRINCIPALES CLASES DE SEMILLAS

**De Legumbres, Flores, Arboles, Arbustos, Pastos,  
Plantas Bulbosas etc. etc.**

DEL

DEPÓSITO DE SEMILLAS

DE

ANGEL PELUFFO.

MERCADO DEL PLATA.

CALLE DE ARTES 173.

BUENOS AIRES.

---

BUENOS AIRES

2155 — Imprenta del PORVENIR, calle Defensa 139.

1876

7 M  
tz

## AL PUBLICO

---

Al ofrecerle nuestro catálogo de semillas, tenemos la satisfacción de poder asegurar á las personas que se dignen honrarnos con su confianza:—1º que las semillas que tenemos SON RECONOCIDAMENTE PROBADAS DE SUPERIOR CALIDAD, y 2º que vendemos MUCHO MAS BARATO que en otra parte.

Estas dos condiciones las garantimos, y no habiendo competencia posible ni en la calidad, ni en el precio de las semillas, estamos seguros de dejar plenamente satisfechas á las personas que nos dirijan sus pedidos.—Nuestras semillas además de ser de SUPERIOR CALIDAD, SON FRESCAS; y la mejor garantía que podemos dar de esto, es DEVOLVER EL DINERO siempre que la semilla vendida por nosotros no nazca ó no sea de la calidad garantida.

Semillas de Francia

Semillas de Italia

Semillas del País

Algunas personas pretenden que no deben usarse de las semillas del país, y que solo las venidas de Europa son buenas.—Una larga esperiencia, el conocimiento práctico del país y relaciones directas que sostenemos con la mayor parte de los agricultores y horticultores, nos dan la íntima convicción de que se obtienen en el país semillas de legumbres, flores y árboles, sobre todo en los pastos de forrage, tan buenos como los que vienen de Europa, teniendo sobre estas la ventaja de ser mas frescas y vigorosas, siendo de todos sabido que hay semillas que al pasar la mar pierden su poder germinativo y no nacen.

Nuestra opinion es pues, como dejamos dicho, que pueden recojerse en el país, semillas de legumbres tan buenas como las de Europa, por medio tambien de un cultivo esmerado de las semillas extranjeras, cuya utilidad y conveniencia consiste en la gran variedad de sus clases y en que permite elejir de entre ellas, buenas y convenientes para recojer semilla fresca en el país, de duracion y de mucho vigor.—En correspondencia con las mejores casas y cultivos de Europa, recibimos mensualmente excelentes semillas para atender especialmente á aquellas personas que desean usar de semillas extranjerias, teniendo estas completamente separadas de las recojidas en el país.

Tanto por nuestros conocimientos prácticos, como por las relaciones directas con los quinteros y chacareros, estamos en aptitud de suministrar á las personas que nos honren con sus pedidos toda clase de datos referentes al cultivo, como ser: la estacion y método mas ventajoso de hacer la siembra, segun el punto donde haya de efectuarse, la cantidad de semilla que se precise para una estension dada y los parages en que deba sembrarse mas temprano ó mas tardío, etc., etc.—No lo hacemos en este catálogo, porque para darlo de un modo completo, con todos los datos precisos para cualquier punto de la Provincia, seria demasiado extenso, y nos faltaria por el momento el tiempo preciso para ordenarlos de un modo sistemado, á pesar de poseer los conocimientos necesarios al efecto.

A las personas que tomen un surtido de semillas de legumbres, se les pondrá en cada paquete, siempre que lo deseen, la época mejor para la siembra,—y vendemos por cualquier cantidad por pequeña que sea—

## PAPAS FRANCESAS Y ALEMANAS

### PARA SEMILLAS

### AVISO IMPORTANTE

Recibimos este artículo mensualmente de Europa en las épocas siguientes :

A primeros de Agosto estacion de empezar la sementera de la primera cosecha, ó cosecha de primavera, y seguiremos recibiendo hasta Enero y Febrero estacion de la segunda sementera de la cosecha, ó cosecha de Otoño. Esta última cosecha es la mas importante del pais y la que es imposible poderla obtener sin la semilla europea.

Asi es que recomendamos mucho á nuestros clientes tengan muy presente que es la segunda cosecha que nos sostiene todo el Invierno, y para obtener una buena cosecha es indispensable la PAPA EUROPEA.

Estas papas tanto de Francia como de Alemania, provienen de los MEJORES CULTIVOS y son de las clases mas afamadas de Europa, siendo especialmente elejidas para nuestro clima.

La experiencia adquirida por varios años, LA PROLIFICIDAD que empleamos en la eleccion, asi como los numerosos esperimentos hechos por nosotros y por los primeros y principales Chacareros y Quinteros de Buenos Aires, nos autorizan para espenderlas con toda confianza. Garantiendo su calidad inmejorable.

Precios los mas reducidos.

Angel Peluffo.

# CATALOGO GENERAL

DE

## PLANTAS Y SEMILLAS.

### semillas de legumbres

Acederas de Belle-ville, de hoja ancha (semilla y plantas)	Alcahucil violeta sin espina temprano.
Achicoria ó Radicha	— id espinoso de Génova.
— de cortar las hojas.	— (semillas y plantas.)
— de raíz.	Batatas blanca de Santa Fé, de Quilmes, Colorada, Amarilla-Camote.
— de Milan.	Berros de Fuentes.
52 + Albahaca hoja ancha italiana.	— de tierra Vivaz.
+ — fina verde.	— de tierra Alenois.
+ — fina violeta.	— Meastuerzo.
Alberjas á ramos.	— Borraja officinalis.
— gigantes de Italia.	Berengena violeta, larga de Valencia.
— 40 dias de Génova.	— id redonda francesa.
— azucaradas inglesas.	— blanca de China.
— Príncipe Alberto, francesa.	— negra de Pekin.
— Laxtons S. Alpha inglesas.	Brocolí ó coliflor morado y verde
— enanas en chauchas.	— temprano de Finale.
Alberjas enanas catalanas, muy productivas.	— tardío de Sicilia.
— de Prusia, verdes.	— Caña dulce del Brasil.
— de Holanda, temprana.	Cidra cayotas.
— de Italia azucaradas.	Cebolla blanca temprana de Nápoles.
— inglesa, muy tempranas	— tardía grande.
Apio blanco lleno de Francia.	— blanca del país p <sup>a</sup> cabeza
— violeta id. ingles.	— amarilla ó inverniza.
— Rava, temprano d'Erfurt.	— colorada claro Hamburgesa.
71 + Azafran del pais.	— colorada oscura de Italia
26 + — en Bulbos de Castilla.	— colorada del país para cabeza.
Acelga blanca genovesa.	
Alcahucil blanco, sin espina.	

Cebolla colorada monstruosa de Madera.	Lechuga por orden: 1º Repollado de primavera.
Coliflor temprano de Paris.	— Daufina.
— medio tiempo, Holanda.	— blanca Gotte.
— Lemetre, pie corto.	— blanca del país.
— Lenormand grande.	Lechuga 2º Repollada de verano y otoño.
— tardío muy grande, de Nápoles.	— batavia blanca.
Col crespo negros romanos.	— batavia verde.
— id colorados, pié corto.	— blanca Royal.
— id de Brusela ó cien por uno.	— blanca de Berlin.
Coli-nabo blanco.	— blanca enana.
— amarillo ó Rutabaga.	— morena Monstrazo.
Cardos blancos llenos.	— repollo de Italia.
— colorado lleno.	— verde crespa, criolla.
Chirivias larga.	Lechuga 3º arrepollada de invierno.
— redonda temprana.	— blanca del país.
Escarola ó endivia, crespa fina, de Italia.	— morena.
— id id id de Meaurs.	— Passian.
— id id id blanca de Holanda.	Lechuga Romana.
— crespa do hoja ancha.	— blanca (verano.)
Escarola hoja ancha blanca de otoño.	— valenciana (verano.)
— id id verde de invierno.	— Monstruoso (verano)
Escorsonera raiz blanca.	— verde, de invierno.
— Raiz negra.	Lentejas de Francia, verdes.
Espinaca inglesa, semilla espin'sa	— de Sicilia, grande amarilla
— de Holanda, id redonda.	— Garbanzos de Castilla.
Espárragos violetas de Holanda.	Maiz para chocho.
— gigante ó Lenormand.	— de azúcar.
Semillas y Plantas de Argenteuil temprano.	— de 40 dias, muy tempr.
Hinojo de Nápoles.	— del Japon, panache.
Habas de Francia tempranas.	— del Japon, panache.
— inglesa Windsor, chatas	Melon escrito del país.
— italiana, muy anhas.	— de Francia cantalup temprano.
— Juliana Verdes.	Cantalup blanco, grande.
— id blanca temprana de Sicilia.	— tardío.
Yerba-buena No da semilla germinativa. Separa los hijuelos de la cepa.	— negro de carne, tempr.
	— blanco.
	— valenciano.
	— de Cavaillan.
	— moscatel
	Mejorana No da semilla germinativa. Separa los hijuelos de la cepa.

- 6 + Orégano. id id. 69  
 Nabos largo del Palatino.  
 Nabos id negro.  
 — medio largo de virtud.  
 — redondo blanco tempr.  
 — redondo encarnado id.  
 — de Norfolk, blanco cuello rosado.  
 — bola de oro.  
 — amarillo de Malta.  
 Papas Francesas y Alemanas, y otras.  
 Perifollo ó cerfeuil comun.  
 Pepinos de Russia temprano ó cornichon.  
 — largo verde.  
 — largo, serpiente verdes.  
 Peregil crespo doble, ingles.  
 — comun liso.  
 Pimientos morrones dulces, encarnados.  
 — dulces redondos encarnado.  
 — largos de Chile picantes.  
 — Redondos Cereza.  
 Puerros largo de invierno.  
 — corto de verano temprano.  
 Rabanitos redondos rosados, de todo el año.  
 — id id punto blanco.  
 — medio largo rosado.  
 — id id id punto blanco.  
 — largo rosado.  
 — largo blanco.  
 — largo negro de invierno.  
 — redondo id de verano.  
 Repollo blanco, hoja lisa.  
 — blanco temprano de Pisa.  
 — id de quintal ó grande de Alemania.  
 — id de York, temprano.
- Repollo blanco pan de azúcar.  
 — de invierno Holandes.  
 — colorado oscuro temprano de Erfiut.  
 — blanco de Montagna.  
 Repollo crespo ó de Milan.  
 — id temprano de Joulin.  
 — temprano de Asti.  
 — tardío de Virtud.  
 — muy crespo, de invierno dorado de Erfust.  
 Remolacha redonda, colorada, precoz ensalada.  
 — id de Bassano id id.  
 — negra de Erfurt, id. id.  
 — piriforme, de Estrasburgo.  
 — blanca, de cuello verde, para forrage.  
 — colorada, cuerno de buey.  
 — amarilla, de azúcar.  
 Rhubarbe de Nepal.  
 Salsifis raiz blanca.  
 — raiz negra.  
 Sandía colorada de Valencia.  
 — amarilla inverniza.  
 — id Cayota.  
 Topinambur  
 Tomillo No da semilla germinable en planta.  
 Tetragane ó espinaca de la Nueva Zelandia.  
 Tomates grandes, tempranos, de Génova.  
 — redondos, forma pera, de Francia.  
 Zanahoria larga, de Tonlosa.  
 — id medio larga.  
 — id corta, temprana de Holanda.  
 — larga, blanca, cuello verde, forrage.

## POROTOS PARA SEMILLA

---

- Porotos Enanos.—Las mejores clases para chaucha.
- Porotos de 40 días
- “ Negros del Brasil.
  - “ Amarillos suizos.
  - “ Gris de Argelia.
- Porotos á ramas—Las mejores clases, para chauchas tiernas y en medio grano.
- Porotos Romanos ó Colorados.
- “ “ ó balines amarillo.
  - “ “ ó balines negros.
  - “ Catalanes Balines blanco ojo negro.
  - “ de Argelia Balines.
  - “ de Génova Balin blanco.
- Porotos Enanos—Las mejores clases para grano verde y seco.
- “ Chatos ó de manteca.
  - “ de 40 días ó cuarenton.
  - “ Habichuelo Blanco.
  - “ Tapes ó firígola.
  - “ Amarillos de Suiza.
  - “ Colorados de Suiza.
  - “ Suasson blanco.
  - “ Gris de Argelia.
  - “ Negro del Brasil.
  - “ del Japon rayados.
  - “ á Ramas para grano verde y seco.
  - “ Riñon ó mantecoso.
  - “ Romanos colorados.
  - “ Chato blancos.
  - “ del Japon rayados.
  - “ de Génova balin blanco.
  - “ Romanos balin amarillo.
  - “ Suasson blanco.
-



**Cereales**

Alpiste	Mijo amarillo de Hungría.
Avena negra de Hungría.	— ó panigo de Italia amarillo, muy menudo.
— blanca de id.	— moha de Hungría.
Cebada del Piemonte, sin cáscara, para loco.	Centeno comun.
— del país.	— de los Alpes ó de Montaña.
— francesa.	— grande de Rusia.
— y de otras procedencias.	Sorgho ó maíz de Guinea, para escobas.
Maiz de azúcar blanco.	— dulce para forrage.
— de 40 dias, amarillo.	Trigo Barleta.
— morocho.	— Marianopoli.
— canario.	— Tangarok.
— guineo para escoba.	— de Chile, trigo duro para fideos, loco y gallos.
— Guineo ó Sargho dulce, para forrage.	
— blanco para pollos.	
Mijo blanco, redondo de Francia	

**Semillas pastoriles, forrageras y económicas.**

Agrostis tracant.	*Lupin amarillos.
— de América grass.	Maíz morado.
Avena blanca de Hungría.	— blanco del Norte América.
— negra de id.	— canario.
Alfalfa del país ó bonacrense.	— amarillo de Piemonte.
— francesa.	— de Guinea para escobas.
— española.	— de id ó Sargho dulce.
— alemana.	Nabos blanco largo.
— chilena.	Raiz grass, inglesa.
— provinciana.	Remolacha blanca, cuello verde.
Cañamon	— amarilla, id id.
Cebada comun.	— de azúcar.
Coles-nabos amarillo Rutabago.	*Trebol blanco.
— blanco id.	* — encarnado.
Col cavalier ó col forragero.	Zanahoria blanca, cuello verde.
Esparceta ó pipirigallo.	— colorada, larga.
Galega officinalis.	
Lown grass	

**Semillas para cespéd.**

Agrostis tracante Fiorin.	Lawn grass p <sup>a</sup> terrenos húmedos
— de América (grass.)	— para id secos.
Ray grass inglesa.	Brame de los prados.
Ray grass Racey muy fino.	Patúñir de los prados.
Ray grass de Italia ó lolium ita- licum.	Trébol blanco. — encarnado.

**Eleccion de las primeras semillas que se pueden sembrar en otoño.**

26 <sup>a</sup> + Adonide de verano.	- + Godetia variada.
26 <sup>a</sup> + Agrotis nebulosa (gramin, ces- ped.)	- + Gyssofilia elegante. 23
26 <sup>a</sup> + Aletris dobles, variado.	- + Siempre-viva anual.
205 + Alisses de olor.	- + Ipomosis elegante. 99
+ Ammobium alatum.	- + Julianas de Mahon (Bordura. 136
49. + Briras diversas (gramincas.)	- + Lebelia diversos.
+ Campanilla variadas.	- + Mimulo variado. 36
73. + Centauro muque.	- + Nemofila diverso. 10
+ Charquia purcheta.	- + Nurembergia gracili.
+ Clintonia elegaute.	- + Clavel de la China. 231
45. + Colinsia tricolor.	- + — de poetas. 93
+ Coquilecot dobles variados.	- + Osealis rosa. 321
+ Coqueler de rosa	- + Amapola doble de jardines.
+ Coriosis elegantes.	- + Pensamiento variado.
2. + Crepsis variado.	- + Fios de Drumon, variado.
261 + Cynoglosse ó hoja de lino.	- + Pies albergilla de olor.
89 + Enother variado.	- + Robekia de Drumon.
73 + Escholsia de California.	- + Scabiusa de los jardines.
297. + Gaillarde pintada.	- + Sonsis diversos.
22. + Gauro Lindeimesi.	- + Verbena variada.
8 + Gilia variada.	- + Violeta de olor.

**Semillas de flores que pueden ser sembradas en primavera.**

+ Abronio umbelata.	- + Aleli doble, variado
+ Acroxlinium Roseun.	- + — escarapela.
Adonide de verano.	- + — doble de invierno va- riado.
+ Agrotis gramineas.	- + — id amarillo.
+ Alstroemere de Chile.	- + Ancolí de jardines, dobles.
+ Alysse canastillo de oro.	- + Albahaca fina, verde.
+ — de olor.	- + — fina violeta.
+ — canastillo de plata.	

- + Bella de dia, panache.  
 + — de noche, variada.  
 + Brincos dobles.  
 + — flor de camelia.  
 + Calandrinia elegante.  
 + Calecolaire hybride tigre.  
 + Campanule gran flor.  
 + — blanca.  
 + — piramidal.  
 + Capuchina (enredadera.)  
 + — subbianum.  
 + — enana.  
 + Caracolillo.  
 + Centauru barbo, variado.  
 + — de olor, barbo amarillo.  
 + Centrantus macrosifon.  
 + Chrysantheme variado.  
 + Cincraire hybride.  
 + Carkia doble blanca carne.  
 + — rosa doble.  
 + Cleome violita orbacea.  
 + Cobu (enredadera.) zapallitos.  
 + Coloquinto bicolor (papallita).  
 + — rayado.  
 + — variado.  
 + Pepinos serpientes.  
 + Careobsis elegantes.  
 + — id enano.  
 + Cruz de Jesuralen.  
 + Floripon de Egipto.  
 + Digitale purpúreo.  
 + — blanco.  
 + Enothere Lamackiona.  
 + Eragrostis elegante panícuna.  
 + Erytrine cresta de gallo.  
 + Frassinelle punzó.  
 + Gilia variada.  
 + Gypsosib elegante.  
 + Hordeum jubatum (grami.)  
 + Iberide Thlaspi olor.  
 + Siempre-viva blanca.  
 + — violeta.  
 + Ipame escarlata.  
 + — variado.  
 + Juliana de los jardines.
- + Juliana de Mahon, variada.  
 + Ketnú de Africa, gran flor.  
 + Lantano variado.  
 + Lavatero arboreo.  
 + — ó grande, flor rosada.  
 + Leplosifan hybride.  
 + Lupines variados.  
 + Lobelia escarlata.  
 + — espectosa.  
 + ~~Mais rayado del Japon.~~  
 + Martinio púrpura.  
 + Malva Mauritania,  
 + — crespa.  
 + ~~Mionulus arlequin.~~  
 + — ~~Capreus~~  
 + — ~~tigrinum, flor llena.~~  
 + Myosotis ó larga flor.  
 + ~~Nemofila insignis.~~  
 + Nigele de damas.  
 + Clavel dobles.  
 + — Flamenco.  
 + — fantasía.  
 + — China doble, variado.  
 + ~~Pueta.~~  
 + ~~Amapola doble.~~  
 + ~~Pensamiento variado.~~  
 + Penacho cresta de gallo.  
 + — tricolor.  
 + Petunio hybride.  
 + — blanco, olor.  
 + — feconde doble variado.  
 + ~~Phos dromand.~~  
 + Pied d'alouette, doble.  
 + — d'alouette hybride, va'do  
 + Primavera de los jardines, id.  
 + Reina Margaritas, anemona va-  
 + riada.  
 + — coronada.  
 + — peonia.  
 + — piramidal, variada.  
 + — flor á flor de Chri-  
 + antheme.  
 + — id imbrique.  
 + — id pompon.  
 + Rosa de India doble, grande.

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| + Ruabekia amplosiaulis.                | + Tagitis Signata pumila.        |
| + Salpiglossis hybride.                 | + Vervena Miquelan-              |
| + Scabreuse de los jardines, varia dos. | + Zinia elegante simple cocciue. |
| + Saucos dobles, variados.              | + — doble, variada.              |

## CABEZAS Y RAICES DE PLANTAS BULBOSAS

**Jacintos dobles y simples de Holanda.**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| + Dobles punzó, muy variados.   | + Simples punzó, variado.     |
| + — rosados, id id.             | + — negro, terciopelo.        |
| + — blancos, id id.             | + — lilas.                    |
| + — violetas, claros porcelana. | + — violeta claro, porcelana. |
| + — azul oscuro.                | + — amarillo.                 |
| + — amarillos, variados.        | + — blanco.                   |
| + — todos cols. entreverados.   | + — rosados, muy variados.    |

**Tulipanes.**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| + Dobles en coleccion.  | + Tardido gran novedad en coleccion y en Melange. |
| + Tempranos en Melange. |   |
| + Dragones.             |   |

**Diversas plantas Bulbosas.**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| + + Amarilis bella domna.                          | + + Azucenas blancas, muy dobles, |
| + — Formosissimo.                                  | + — amarillas del Japon.          |
| + — de colores, gran varied.                       | + — id Martagon piramidal.        |
| + Narcisos dobles, id id.                          | + — tigrinum.                     |
| + — á Buguet, id id.                               | + — lungiflorum.                  |
| + Junquillos dobles.                               | + Amarfulalus Rivieri.            |
| + Gladiolus Gandavensis, gran riedad.              | + Scillas marítimas.              |
| + — Ramusus, id id.                                | + — peruviana.                    |
| + — cardinalis, id id.                             | + Peonia punzó.                   |
| + — de miniatura, id id.                           | + — rosada.                       |
| + Anémonas dobles, variadas.                       | + — blanca.                       |
| + Boursingaultia (enredadera.)                     | + Pancracium maritimum.           |
| + Marimónas dobles, variadas.                      | + — de illyrée.                   |
| + Esparasis variado.                               | + Nardos dobles.                  |
| + Ixio id.   | + Muscaris monstruosos.           |
| + Iris en gran coleccion,                          | + — variados.                     |
| + Crocus en coleccion.                             | + Ferrária variada.               |
| + Frittedario coronas imperiales ó debles coronas, | + Dalias dobles.                  |
|  | + — id matizadas del Brasil.      |

## Semillas de árboles y arbustos.

- |     |                            |                                  |
|-----|----------------------------|----------------------------------|
| + + | Acacia blanca ó rubinia.   | Calothamnus villasa.             |
| + + | — negras.                  | — gracilis.                      |
| + + | — melanoxylon, gran árbol. | Dommará orientalis.              |
| + + | — dealbata.                | — australis.                     |
|     | — lofanta.                 | — mocri.                         |
|     | — oxycedras.               | Dacrydium cupressimum.           |
|     | — armata.                  | Exocarpus cupressiformis.        |
|     | — decepiens.               | Elacocarpus cyaneus.             |
|     | — dentifera.               | Eucaliptus globulus.             |
|     | — flatyptera.              | — gigantea.                      |
|     | — cyanophylla.             | — robusto.                       |
|     | — calanifolia.             | — rostrato.                      |
|     | — juniperiana.             | — elata.                         |
|     | — glaucas.                 | * Frambuesas á fruto rojo comun. |
| + + | — julibrinses.             | + — de fruto en todo el año.     |
|     | — drummondi.               | Francinus Esceliosior.           |
|     | — angustifolia.            | Frenela fructicosa.              |
|     | — molísima.                | — Rhomboidea.                    |
|     | Araucaria brasiliensis.    | — Rocf.                          |
|     | — imbricata.               | — triquetra.                     |
|     | — excelsa.                 | — Variabilis, Australis y        |
|     | — cunningghomi.            | Robusta.                         |
|     | — cooki.                   | Grosellero Fruto Blanco.         |
|     | Agnostus.                  | — id morado en racimos.          |
|     | Alisiu de los bosques.     | — id rojo.                       |
| + + | Amorfa fruticosa.          | Ilese Cassine.                   |
|     | Aralie espinoso.           | — aquifolium.                    |
|     | Actinostrobos pyramidalis. | Goodia                           |
|     | Amarfa fruticosa.          | — latifolia.                     |
|     | Brachysema latifolium.     | Genetyllis Microstegia.          |
| + + | Billardiera longiflora.    | * Griselinia littoralis.         |
|     | Bignonia catalpa.          | * Hardenbergia monopholla.       |
|     | Beaufortia Splendens.      | * — maeropholla.                 |
|     | — purpurea.                | Libocedrus Doniana.              |
|     | Boronia titrandra.         | Lacchordtia Macleyana.           |
|     | Casuarina stricta.         | * Linicera Negra.                |
|     | — equisetifolia.           | + — Caprifolium.                 |
|     | — quadrivalvi.             | + — Tartarico.                   |
|     | — torulosa.                | * Ligustrum Japonico.            |
|     | — lateriflora.             | + — Vulgaris.                    |
|     | Calopelalan ringens.       | Moarianthus coeruleo pruneta-    |
|     | Calothamnus quadrifira.    | tus.                             |
|     |                            | Melabeuca Viridiflora.           |

Melabeuca Armillaris.	Pinos insignis Alepensis.
— Pulchella.	— “ Silvestre de Escocia.
— Trymifolia.	— “ Strobos.
— Decussanta.	— “ Lambertiana.
— Fulgens.	— “ Montaña.
— Squarrosa.	Photinia Glalza.
Myrtus Bullato.	Ruhus fauciaro.
— lenuifolio.	Rhus cotinus.
Mora Blanca.	— Typhino.
Ñapinday (Para cercos.)	Sollza Leteropayllo.
Ormo comun á grandes hoias.	Slaamannia australis.
Podocarpus trichomanoises.	Tosmannia aromática.
— hypophylla.	Trimamaliun Albisun.
— phomboidales.	Templetonia retuso.
Podolobium trilobatum.	Tristania nerifolia.
Paundonia imperiali.	— macrophylla.
Pinos insignis.	Thuya orientalis.
— Maritimo.	— de la China.
— Canariensis.	Wellingtonia giganteo.
— de Piñon.	